

指標の意義

センチネルリンパ節生検により転移のある腋窩リンパ節廓清を確実に行い、不必要的腋窩リンパ節廓清および、これに伴うリンパ浮腫発生を減らす。

指標の定義・算出方法

- ・必要データセット: DPC様式1、EFファイル
- ・分子: 分母のうち、腋下リンパ節郭清が実施された症例数
- ・分母: T1-2,N0M0の乳がん(初発)で入院して手術を施行した症例数
- ・分子÷分母 (単位: パーセント)

分母の定義

- 解析期間に退院した症例を対象とする
- このうち、様式1の生年月日、入院日より入院時年齢を求めた18歳以上の症例。
- このうち、乳房の悪性新生物(乳がん)の診断を受けた症例。いずれかの病名のICD-10コードとして以下のいずれかが含まれる症例。かつ、以下の2条件を満たす症例。
 ① 様式1「がんの初発、再発」が「初発」かつ
 ③「UICC病期分類(T),(N),(M)」がT1\$ (3桁以降はワイルドカード、T1a等を含む)またはT2、かつN0、かつM0

ICD コード	病名
C50\$	乳房の悪性新生物

- このうち、下記手術を受けた症例。手術情報の点数コードのいずれか(5フィールド)に以下のいずれかが含まれる症例

レセ電コード (診療行為コード)	手術点数コード	手術名
150121610	K4761	乳腺悪性腫瘍手術 (単純乳房切除術) (乳腺全摘術)
150303110	K4762	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房部分切除術) (腋窩部郭清を伴わない)
150316510	K4763	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) (腋窩部郭清を伴わない)
150262710	K4764	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房部分切除術) (腋窩部郭清を伴う)
150121710	K4765	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) (腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの) (胸筋切除を併施しないもの)
150121810	K4766	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) (腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの) (胸筋切除を併施するもの)
150121910	K4767	乳腺悪性腫瘍手術 (拡大乳房切除術)
150386410	K4768	乳腺悪性腫瘍手術 (乳頭乳輪温存乳房切除術 (腋窩郭清を伴わない))
150386510	K4769	乳腺悪性腫瘍手術 (乳頭乳輪温存乳房切除術 (腋窩郭清を伴う))

分子の定義

- 腋下リンパ節郭清を受けた症例。手術情報の点数コードのいずれか(5フィールド)に以下が含まれる症例

レセ電コード (診療行為コード)	手術点数コード	手術名
150262710	K4764	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房部分切除術) (腋窩部郭清を伴う)
150121710	K4765	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) (腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの) (胸筋切除を併施しないもの)
150121810	K4766	乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) (腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの) (胸筋切除を併施するもの)
150122150	K4767	乳腺悪性腫瘍手術と両側腋窩リンパ節郭清術

測定上の限界・解釈上の注意

- K-コード分類は年度により異なってくるので、その都度確認が必要である。
- 他の施設と指標値が大きく異なる場合は、診療行為の見直しのきっかけとなる。
- 「UICC病期分類」は治療前に得られた臨床情報も含む情報に基づく分類(cTNM)であり、pTNM(術後病理所見による),sTNM(手術所見による)と異なる場合があり、本来ならリンパ節郭清術の適応にならない症例も含まれる可能性がある。

考察

最小値 0 25%値 0.78% 中央値 15.56% 75%値 50 最大値 100 回答病院 45

2016年新規指標のため前年比較はありません。

腋窩リンパ節廓清実施率が50%以上の9病院はいずれも年間の対象手術件数が10件未満です。センチネルリンパ節生検の算定は施設基準の要件を満たしている必要があるため、センチネルリンパ節生検実施数が0であっても実際には同様の手技を行い腋窩リンパ節廓清の必要性を判断している可能性もあります。中央値は前年値より4%ほど低下しています。リンパ浮腫などの後遺症の発生リスクを考えると、腋窩リンパ節廓清は最小限にとどめることが望ましいといえます。

参考資料

- i : 浸潤性乳がんにおいて、腋窩リンパ節郭清を実施した方が生存率が高まることを実証した確定的データは存在しないため、特に予後良好と思われる腫瘍の患者つまり、術後全身療法を選択しても影響されないと思われる患者、高齢者、あるいは深刻な併存疾患がある患者では、腋窩リンパ節郭清の実施は必ずしも必要ではない。
(National Comprehensive Cancer Network:NCCN® ガイドライン2012)
- ii : センチネルリンパ節生検の経験が豊富な外科チームがいて、患者がセンチネルリンパ節生検の候補として適切と思われる場合は、腋窩リンパ節病期診断よりもセンチネルリンパ節生検の方が望ましい方法となる(NCCN® ガイドライン2012) 1 : アレルギーなどの適用外の患者も含まれてしまうため、値が低く算出される可能性がある。

指標39 : T1-2,NOMO乳がん手術患者に対する腋下リンパ節郭清実施率

指標39分母 : 退院患者中Stage I II (T1-2,NOMO) 乳がん(初発)で手術を受けた患者

指標39分子 : 腋窩リンパ節郭清が実施された患者数

指標39 : T1-2,NOMO乳がん手術患者に対する腋下リンパ節郭清実施率


	指標39分母		指標39分子		指標39	
	人	年間合計値	人	年間合計値	%	年間合計値
勤医協中央病院	50	51	8	2	16.00	3.92
勤医協札幌病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
苫小牧病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
一条通病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
函館療北病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
釧路協立病院	4	4	3	2	75.00	50.00
健生病院	6	7	6	7	100.00	100.00
あおむり協立病院	0	0	0	0	なし	なし
川久保病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
坂総合病院	18	25	4	5	22.22	20.00
長町病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
泉病院	0	0	0	0	なし	なし
中通総合病院	48	35	20	15	41.67	42.86
本間病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
鶴岡協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
至誠堂総合病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
医療生協わたり病院	2	0	2	0	100.00	なし
前橋協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
利根中央病院	9	7	2	2	22.22	28.57
北毛病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
埼玉協同病院	25	30	4	6	16.00	20.00
埼玉西協同病院	0	0	0	0	なし	なし
熊谷生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
秩父生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
千葉健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
船橋二和病院	35	29	1	3	2.86	10.34
みさと健和病院	13	21	0	0	0.00	0.00
小豆沢病院	0	0	0	0	なし	なし
大田病院	5	5	2	3	40.00	60.00
東葛病院	10	12	2	0	20.00	0.00
中野共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
立川相互病院	15	32	3	1	20.00	3.13
王子生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
川崎協同病院	2	4	1	0	50.00	0.00
汐田総合病院	0	0	0	0	なし	なし
下越病院	0	0	0	0	なし	なし
富山協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
城北病院	3	4	0	0	0.00	0.00
甲府共立病院	0	0	0	0	なし	なし
巨摩共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
石和共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
長野中央病院	4	8	2	4	50.00	50.00
健和会病院	6	2	0	0	0.00	0.00
識訪共立病院	0	0	0	0	なし	なし
松本協立病院	5	4	2	1	40.00	25.00
上伊那生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
みどり病院	0	0	0	0	なし	なし
三島共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
協立総合病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
総合病院南生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
北病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
名南病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
千秋病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
津生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
京都民医連第二中央病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
京都民医連中央病院	33	33	5	0	15.15	0.00
東大阪生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
西淀病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
耳原総合病院	27	29	4	2	14.81	6.90
コープむさか病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
東神戸病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
尼崎医療生協病院	0	0	0	0	なし	なし
おかに病院	0	0	0	0	なし	なし
土庫病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
和歌山生協病院	0	2	0	1	なし	50.00
鳥取生協病院	4	2	4	2	100.00	100.00
総合病院松江生協病院	11	12	0	1	0.00	8.33
出雲市民病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
総合病院水島協同病院	15	17	1	5	6.67	29.41
玉島協同病院	0	0	0	0	なし	なし
総合病院岡山協立病院	6	5	1	3	16.67	60.00
総合病院福島生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
広島共立病院	22	24	1	0	4.55	0.00
宇部協立病院	1	0	0	0	0.00	なし
徳島健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
高松平和病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
愛媛生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
高知生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
健和会大手町病院	5	1	4	1	80.00	100.00
千鳥橋病院	6	27	0	3	0.00	11.11
米の山病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
みさき病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
上戸町病院	0	0	0	0	なし	なし
くわみず病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
大分健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
宮崎生協病院	2	2	1	0	50.00	0.00
鹿児島生協病院	2	6	2	5	100.00	83.33
国分生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
沖縄協同病院	20	18	3	1	15.00	5.56
中部協同病院	0	0	0	0	なし	なし
じよみ生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
最大値(外れ値を除く)	27.00	35.00	6.00	5.00	100.00	100.00
75%値	12.50	17.75	2.75	2.00	50.00	50.00
中央値	4.00	4.00	1.00	0.00	20.00	15.56
25%値	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.78
最小値(外れ値を除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

指標39 : T1-2,N0M0乳がん手術患者に対する腋下リンパ節郭清実施率

指標39分母：退院患者中Stage I II (T1-2,N0M0) 乳がん（初発）で手術を受けた患者

指標39分子：腋窩リンパ節郭清が実施された患者数

单位：%




指標39 : T1-2,N0M0乳がん手術患者に対する腋下リンパ節郭清実施率

指標39分母 : 退院患者中Stage I II (T1-2,N0M0) 乳がん（初発）で手術を受けた患者

指標39分子 : 腋窩リンパ節郭清が実施された患者数

単位 : %



* 外れ値を除く

	2015年 年間合計値	2016年 年間合計値
最大値*	100.00	100.00
75%値	50.00	50.00
中央値	20.00	15.56
25%値	5.61	0.78
最小値*	0.00	0.00