

指標の意義

急性膵炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施状況を把握する。

指標の定義・算出方法

- ・必要データセット：DPC 様式 1、EF ファイル
- ・分子：入院 3 日以内に経腸栄養（鼻腔栄養により定義）を実施された症例
- ・分母：急性膵炎で入院し退院した中等症から重症例（軽症例を除く）
- ・分子÷分母（単位：パーセント）

分母の定義

- I. 解析期間に退院した症例を対象とする
- II. このうち、もっとも資源を投入した傷病および入院の契機となった傷病名に下記の ICD-10 コードが該当すれば対象とする（疑い病名は除く）。

ICD-10 コード	病名
K85	急性膵炎

- III. このうち、軽症膵炎は除外する。

様式 1 の急性すい炎の重症度分類（A. 予後因子合計点数、B. 造影剤 CT 重症度スコア合計点数）について、A が 3~9、あるいは B が 2~4 で記載されている場合に中等症から重症の症例として分母の症例とする。ただし、A と B が両方とも 9「99」で入力されている症例は不明例として除外する。

分子の定義

- I. 入院から 3 日以内に経腸栄養が実施されている症例
- 入院から 3 日以内に J120 「鼻腔栄養」の算定があるもの

レセ電コード	行為名称
140023210	鼻腔栄養

測定上の限界・解釈上の注意

早期の経腸栄養（EN）は 感染症合併率を軽減させるとして推奨されているが、一方で、経口摂取の再開により膵炎が再開する場合もあり早期から経口摂取が開始されている症例は軽症例であると考えられる。このため、本指標は当初、食事療養がされている症例について除外していたが、流動栄養剤を食事として算定すると考えられ、2016 年 1 月に定義の改訂を行い、様式 1 の重症度を用いて軽症症例を除外することにした。

レセ電コード	行為名称
197000110	入院時食事療養（1）
197000710	入院時食事療養（2）

胃管からの EN が十二指腸を超えた部分での EN と同等に安全であるかは明確にはされていないが、ガイドライン上薦められている EN を積極的に行っている病院では、十二指腸以遠での栄養が行われていることが予想される。

参考 J120 鼻腔栄養に関連する栄養処置に関する通知（抜粋）：

患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。

患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の所定点数及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。この場合において、当該保険医療機関が入院時食事療養（I）又は入院時生活療養（I）の届出を行っているときは入院時食事療養（I）又は入院時生活療養（I）の食事の提供たる療養に係る費用を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれぞれ算定する。

考察

最小値 0 25%値 0 中央値 0 75%値 0 最大値 0

回答病院 45

外れ値を除くと最大値が0という結果となっており、実績のある3病院はすべて外れ値ということになります。急性膵炎診療ガイドライン2015(急性膵炎ガイドライン2015改訂出版委員会編)によると、経腸栄養は早期に開始すれば、合併症発生率を低下させ生存率の向上に寄与するので、遅くとも入院後48時間以内に開始することが望ましい(CQ30推奨度2,エビデンスレベルA)とあります。高度のイレウスや腸管虚血、腸管壊死に注意しながら施行すれば、重症例においても早期から経腸栄養が可能であり、可能であれば入院後48時間以内に経腸栄養を少量からでも開始すべきであるとしています。また、日本の疫学調査によれば、経腸栄養療法の施行率は急性膵炎全症例の3.9%、重症例でも10.7%であり、十分に普及していないとも指摘しています。経腸栄養の実施は前年1病院のみだったのが2016年は3病院となりました。しかし症例数でみると、参加病院全体で対象症例144症例のうち経腸栄養実施は4例にすぎません。まずは普及が必要です。

参考資料

急性膵炎診療ガイドライン2010「第3版」重症度の判定は、様式1のデータ「急性膵炎の重症度判定基準(2008年改訂)」に沿う

A. 予後因子 0~9 3点以上を重症、2点以下を軽症と判定

B. 造影CT Grade 0~4 造影CT Grade 2(2点)以上を重症、Grade 1以下を軽症と判定します

指標47：急性肺炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合

指標47分母：急性肺炎で退院した症例（軽症者を除く）


指標47分子：入院3日以内に経腸栄養を実施された症例

指標47：急性肺炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合

	指標47分母		指標47分子		指標47	
	件	件	件	件	%	%
	2015年 年間 合計値	2016年 年間 合計値	2015年 年間 合計値	2016年 年間 合計値	2015年 年間 通算	2016年 年間 通算
勤医協中央病院	14	23	0	0	0.00	0.00
勤医協札幌病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
苫小牧病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
一条通病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
函館棲北病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
釧路協立病院	0	3	0	0	なし	0.00
健生病院	5	7	2	2	40.00	28.57
あおもり協立病院	0	0	0	0	なし	なし
川久保病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
坂総合病院	2	1	0	0	0.00	0.00
長町病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
泉病院	0	0	0	0	なし	なし
中通総合病院	2	5	0	0	0.00	0.00
本間病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
鶴岡協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
至誠堂総合病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
医療生協わたり病院	2	0	0	0	0.00	なし
前橋協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
利根中央病院	3	3	0	0	0.00	0.00
北毛病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
埼玉協同病院	0	3	0	0	なし	0.00
埼玉西協同病院	0	0	0	0	なし	なし
熊谷生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
秩父生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
千葉健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
船橋二和病院	5	4	0	0	0.00	0.00
みさと健和病院	8	2	0	0	0.00	0.00
小豆沢病院	0	0	0	0	なし	なし
大田病院	2	0	0	0	0.00	なし
東葛病院	5	3	0	0	0.00	0.00
中野共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
立川相互病院	5	3	0	0	0.00	0.00
王子生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
川崎協同病院	1	1	0	0	0.00	0.00
汐田総合病院	2	0	0	0	0.00	なし
下越病院	7	2	0	0	0.00	0.00
富山協立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
城北病院	2	1	0	0	0.00	0.00
甲府共立病院	20	11	0	0	0.00	0.00
巨摩共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
石和共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
長野中央病院	6	12	0	0	0.00	0.00
健和会病院	1	3	0	0	0.00	0.00
諏訪共立病院	0	0	0	0	なし	なし
松本協立病院	2	1	0	0	0.00	0.00
上伊那生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
みどり病院	0	0	0	0	なし	なし
三島共立病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
協立総合病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
総合病院南生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
北病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
名南病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
千秋病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
津生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
京都民医連第二中央病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
京都民医連中央病院	3	8	0	0	0.00	0.00
東大阪生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
西淀病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
耳原総合病院	5	3	0	0	0.00	0.00
コープおおさか病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
東神戸病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
尼崎医療生協病院	1	0	0	0	0.00	なし
おかたに病院	0	0	0	0	なし	なし
土庫病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
和歌山生協病院	0	1	0	0	なし	0.00
鳥取生協病院	7	3	0	0	0.00	0.00
総合病院松江生協病院	3	2	0	0	0.00	0.00
出雲市民病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
総合病院水島協同病院	3	2	0	0	0.00	0.00
玉島協同病院	0	0	0	0	なし	なし
総合病院岡山協立病院	0	4	0	0	なし	0.00
総合病院福島生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
広島共立病院	0	3	0	0	なし	0.00
宇部協立病院	0	1	0	0	なし	0.00
徳島健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
高松平和病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
愛媛生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
高知生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
健和会大手町病院	9	9	0	0	0.00	0.00
千鳥橋病院	4	2	0	0	0.00	0.00
米の山病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
みさき病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
上戸町病院	0	0	0	0	なし	なし
くわみず病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
大分健生病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
宮崎生協病院	1	3	0	1	0.00	33.33
鹿児島生協病院	6	3	0	0	0.00	0.00
国分生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
沖縄協同病院	9	12	0	1	0.00	8.33
中部協同病院	0	0	0	0	なし	なし
とよみ生協病院	NA	NA	NA	NA	NA	NA
最大値(外れ値を除く)	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75%値	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央値	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25%値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
最小値(外れ値を除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


指標47：急性膵炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合

指標47分母：急性膵炎で退院した症例（軽症者を除く）
 指標47分子：入院3日以内に経腸栄養を実施された症例
 単位：%



指標47：急性膵炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合

指標47分母：急性膵炎で退院した症例（軽症者を除く）
指標47分子：入院3日以内に経腸栄養を実施された症例
単位：％



* 外れ値を除く	2015年 年間 通算	2016年 年間 通算
最大値*	0.00	0.00
75%値	0.00	0.00
中央値	0.00	0.00
25%値	0.00	0.00
最小値*	0.00	0.00